

Сейчас сезон гриппа и простуды. Важно ли в этот период вакцинироваться?

Важно, так как у лиц из групп риска грипп и коронавирус могут вызвать серьезные осложнения. Между прививками от гриппа и COVID-19 должно пройти не менее 30 дней



От чего в первую очередь нужно вакцинироваться — от коронавируса или гриппа?

С учетом эпидситуации, если человек не болел коронавирусом или не вакцинировался от него, то сначала нужно привиться от COVID-19. Спустя 30 дней после полного цикла вакцинации можно ставить прививку от гриппа



Какую прививку нужно поставить? С какого возраста ее можно ставить?

Есть вакцины от гриппа, разрешенные к применению с 6 месяцев, также они не противопоказаны во время беременности. «Спутник Лайт» — для тех, кто переболел COVID-19 или уже привит от него. У «Гам-КОВИД-Вак» нет противопоказаний для беременных. Все вакцины от коронавируса разрешены к применению лицам старше 18 лет



Вакцина от гриппа бесплатная? Куда за ней обратиться?

Бесплатная, как и от коронавирусной инфекции. Вакцинироваться можно в поликлинике по месту жительства. Также многие работодатели организывают вакцинацию сотрудников на рабочих местах



Если вакцинировался от COVID-19 давно и пришло время ревакцинации, то как это совместить с прививкой от гриппа?

Сначала поставить прививку от гриппа, а через 30 дней ревакцинироваться от коронавируса



Какое обследование нужно пройти перед вакцинацией?

Здоровому человеку специальное лабораторное обследование проходить не нужно. Лица с хроническими заболеваниями и старшего возраста проходят обследования у лечащих врачей. Например, если у пациента сахарный диабет, то именно эндокринолог дает заключение и рекомендации по вакцинации

